

มีอาการไม่สบายเมื่อ

กลับเข้าไต้หวันหลังพักผ่อนที่เมืองไทย?

ระวังอาจเป็นโรคชิคุนกุนยา!





พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคชิคุนกุนยาทั่วโลก



- ทวีปอเมริกา : บราซิล อาร์เจนตินา โบลิเวีย
- ทวีปเอเชีย : อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา มณฑลกว่างตู่ของจีน
- ทวีปแอฟริกา : เกาะเรูนียง ดินแดนของฝรั่งเศสในมหาสมุทรอินเดีย

อาการทั่วไป

- มีไข้
- มีผื่นขึ้น
- ปวดศีรษะ
- ปวดข้อ
- ปวดกล้ามเนื้อ



วิธีป้องกันโรค

- สวมเสื้อผ้าแขนยาวขายาวสีอ่อน
- ใช้ยากันยุงที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งมีส่วนผสมของสารไดเอทิลโทลูเอไมด์ (DEET)
พิคาร์ดิน (Picaridin) หรือเอทิลปีวทิลอะซิทิลอะ
มิโนไพโอเนต (IR3535)
- หลังเดินทางเข้าไต้หวันหากมีอาการ ควรรีบไปพบ
แพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางของตนเอง



หากมีข้อสงสัย โปรดโทรสายด่วนป้องกันโรค 1922
หรือ 0800-001922 เพื่อขอคำปรึกษา หากต้องการ
ล่ามแปลภาษากรุณาโทร 1955